

wa.

not.
elle a paru encore à tout le monde. on
croient que l'incision des teguments est plus
avantageuse lorsqu'elle est grande; mais est
moderée en elle. on tirent une tête d'enfant
par une pleye comme celle la; et elle aboutit
comme on le voit, à une petite entaille legere
au col de la vesie, dont le delivrement est
le point capital de l'operation.

m. le car après avoir tâté la Région ou
 perinée et reconnu la partie supérieure de la
 convexité de sa fonde, appuie le pouce de
 la main gauche pour ~~bonder la fonde au~~
~~dehors~~ de l'endroit où il veut commencer
 l'incision, afin de bonder la peau avec son
urotrotoire il fait une grande incision
 oblique depuis le desous de la symphise de
 los pubis jusqu'à un pouce de la fesse. cette
 incision a environ 5 pouces. du p. corp de
 bistoury, et le C. donne à la playe toute
 la longueur dont il la veut, mais il peute
 être peu. il met le doigt index de la main
 gauche dans l'angle sup. de la playe, et il
 coupe les ^{corps} graisses profondément par plusieurs
 corps de l'urotrotoire d'ordres suivans une
 ligne courbe autour du rectum. Le doigt
 indicateur de la main gauche dirige l'extrémité
 de l'urotrotoire dans l'urètre un peu au dessus du
 bulbe qu'il coupe; l'opérateur prend ensuite
 avec la main gauche, le manche de cet instru-
 ment dont la pointe reste dans la cannelure
 du catheter, et de la main droite il conduit
 dans cette cannelure, le ^{long} ~~fin~~ ^{goutte} ~~fin~~
 courbé sur la place de l'urotrotoire qui regarde
 la cuisse gauche du malade, l'urotrotoire
 dans la cannelure du catheter; il retire l'urotro-
 toire et prenant lui même le manche de la fonde
 il la pousse vers la symphise du pubis en
 inclinant le manche vers l'aîne droite, et il
 porte son urotrotoire dans, jusqu'à dans la
 vessie. il le retire ensuite le long de la

not. en le p. avec une pifance, et fucati. Les
 os intérieurement couverts des uns par les autres
 par des gouttières ou cannelures qui rendent
 l'opération facile, mais avec un seul bistouri
 m. Chaselden faisoit, et tous ceux qui vendent
 l'opération font avec un seul instrument
 l'opération de la taille dans la plus gr^{de}
 profusion. il faut de savoir précisément
 en quoy consiste cette profusion. l'incision
 extérieure étant faite sans avoir égard à la
 fonde placée dans le canal de l'urètre
 ou l'organe de l'homme qui se trouve entre les muscles
 creux et accélérateurs. jusqu'à ce que l'apophyse
 simple qui n'est que la peau et la gaine
 et qui n'est d'aucune conséquence contre le
 malade. La dissection du b^{is} cellulaire
 que fait m. de Cat ne nous paroit pas
 utile, puisqu'il n'est pas le b^{is} qui
 fait d'usage, il est compréhensible, et on peut
 tirer une grosse pierre par une petite incision
 du b^{is} qui se trouve, de dissection plus étendue
 peuvent donner lieu à des hémorragies, enfi-
 n il ne faudroit pas le faire quand il n'y auroit
 d'autre inconvénient que d'infirmité, et je le
 crois bien démontré. que reste-t-il donc à
 faire après une incision suffisante des teguments
 afin de couper le ~~col~~ la prostate qui
 embrasse le col de la vésie et qui en est elle
 même une partie constitutive. dans lequel
 apparaît un os tombé pour au col de la
 vésie, et on croit avoir bien de l'avantage.

cannelure de la fonde, et à la faveur d'une
 gouttière qui est sur le plat de l'urètre
 il conduit dans la cannelure de cathéter le
 gorgere, qu'il fait glisser dans la vésie.

m. le cat a fait toute cette manœuvre
 de p. fixer qu'il a taillé. Cette première
 opération n'a servi qu'à faire voir aux spectateurs
 cette méthode d'opérer, et don n'a pu examiner
 la prostate.

le second foye taillé a été examiné. La symphyse
 des os pubis séparé, et les parties gauche et de
 droite de l'urètre de la prostate ayant été fixées, la
 on a decouvert la partie antérieure et latérale
 gauche de la vésie. la prostate ^{est coupée} en partie, extérieu-
 rement, et effleurée par une section d'une ligne
 de profondeur du côté gauche et presque
 inférieure du canal de l'urètre jusqu'à l'issue de la
 vésie inclusivement.

le 3^e foye a été taillé de même; les mêmes
 parties ont été continuellement examinées. on n'a
 pu examiner quel étoit l'état des muscles creux
 et accélérateurs, et qu'ils étoient devenus le verre ou l'urètre.

m. le cat a dit qu'il pourroit graduer son
 incision et couper la prostate plus ou moins
 profondément, il a fait trois à quatre en
 gorgere urètre circulaire. il en fit une laine
 qu'on fixa à différents degrés au moyen d'une
 vis. il en a par fait le foye.

m. Thomas a taillé un foye avec
 son instrument. il a vu injecté la vésie; il a
 très facilement après, l'examen de la prostate a
 montré qu'il avoit percé le fond de la vésie;



en entrant dans l'urètre immédiatement au-dessous
 du plexus de bouge. cette méthode a des inconvénients
 absolus et relatifs qu'on peut décrire et faire
 comprendre à ceux qui taillent ainsi, s'ils étoient
 susceptibles d'après la volonté de se refuser
 à de convenir qu'ils ont pratiqué une méthode
 mauvaise. mais quelques fois les hommes
 attachés à leur routine, et le nombre de victimes
 qu'ils ont sacrifiées ne leur ayant pas dissipé les
 yeux, il n'y a point d'empêchement de conviction. —
 ni de cet effleur de prostate et la coupe
 en partie extérieurement. par cette méthode
 il diminue la résistance, mais il nôte pas
 tout l'obstacle. c'est la prostate seule qui
 donne de la difficulté. ni cependant la coupe
 entièrement et il avoit raison. il avoit commencé
 par pincer dans l'urètre au-dessous de la symphyse
 du pubis, et il portoit son bistouri de dehors en
 dedans dans le long de la cannelure de la sonde pour
 couper la prostate. apparemment qu'il s'est aperçu
 qu'elle fuyoit sous le tranchant du bistouri, et
 qu'il ne la coupoit qu'imparfaitement. il a pris
 la partie de la coupe de derrière en devant, et
 de bas en haut, et pour pratiquer cette section
 il faut tourner le dos du bistouri vers la tubérosité
 de l'ischion, et prendre la cannelure de la sonde
 derrière la prostate, on la coupe en remontant
 avec le bistouri vers les pubis. le doigt index
 de la main gauche, et celui du milieu dans les quel-
 ques sujets favorables de conducteurs; quand la prostate
 est coupée, l'opérateur retire l'instrument tranchant
 et porte à la face du doigt qui est dans la
 plaie et qui touche la prostate à nu, il porte
 le grandeur dans la reprise. l'expérience a montré
 l'insécurité de cette méthode. et il n'y a aucune
 raison qui puisse donner la préférence à une autre
 méthode.

en coupe l'extrémité de l'urètre gauche

Le samedi pr. de mort
à 3 heures de relevée, à l'hôpital de
Bicêtre en présence des mêmes commissaires
M^r. Moreau absent, et aussi en présence
de M^r. de la faye, et de Goussier. on
a taillé

N. incision de la vésie par le vivant
résiste à l'injection

1^o. M^r. Thomas a fait son opération. il a
commencé par injecter beaucoup d'eau dans la
vésie. son cystostome étoit au 20^e degré
l'incision externe avoit à peu près deux pouces de
longueur et étoit absolument à nud. l'incision au
corps de la vésie à côté du col étoit verticale
et avoit un pouce de longueur. la vésie
étoit cellulaire et pleine de brides. il en restoit
quelques-unes que le fond de la vésie avoit
été blessé en un de la place par la
pointe du trocart, comme dans le sujet que
M^r. Thomas a taillé aux invalides. mais
on a regardé cet endroit comme l'entrée d'une
cellule.

2^o. M^r. Forbes a taillé à sa méthode. le
sujet avoit été préparé par l'injection de
la vésie. M. F. s'est servi d'un trocart avec
un ressort à boudin qui fait rentrer le
piston dans la canule. l'incision de la
vésie étoit bien placée, mais petite et faite
uniquement par la position du couteau.
on a introduit le gorgere dilatateur qui
a déchiré la vésie par l'écartement des
branches, après quoi est convenu que
M^r. Thomas finit par son incision



+ Ce nouvel instrument n'est pas épais.

+ la grande place que les plombs
montrent dans la mémoire du pr. volu.
de l'Académie en une importance

une ouverture après grande au corps de la
vespie, et que ~~cette~~ ^{à u de} ~~ouverture~~ ^{ouverture} étoit ~~de~~
faite secondairement par déchirure dans
la méthode de Mr. Fischer au moyen de
l'écartement des branches du gorgon. on
a mis une grosse pierre dans la vespie, elle
a été tenue avec après de faiblesse; mais elle
a fait un déchirement proportionné à son
volume.

3^e M. lecat a fait sur le 3^e sujet
une opération. d'incision extérieure très grande
le col de la vespie effleuré intérieurement
et la prostate coupée en partie à l'extérieur
comme dans les expériences précédentes. Il a fait
l'extraction d'une grosse pierre après aisément
la déchirure de la vespie s'est prolongée inte-
rieurement.

1^{re} ce qui reste de la prostate existe et suffit
pour faire étendre la plaque de la vespie après
l'op. si l'obstacle étoit tout à fait débarrassé
par une section entière de bourses de la
vespie, l'extraction feroit aisée, et tout l'effort
il y a eu de se presser en dedans de la pierre
du côté de l'urètre, lequel bien insuffi ne
peut apporter aucune résistance.

4^e M. lecat a taillé une femme
il a introduit la sonde ^{à cannelé} ordinaire qui
par commencement aux incisions, il lui
a donné auparavant vers l'extrémité une
légère courbure du côté de la cannelure
qui étoit extérieurement sur la concavité.
~~sur cette~~ ^{de cette} ~~de cette~~ ^{de cette} sonde il a glissé dans
la vespie par gorgon à lame tranchante,
laquelle a coupé du côté gauche l'urètre
et le col de la vespie et six lignes de son
corps. c'est un delidement latéral.

très étendue par delà le col. ce qui
peut donner lieu à des infiltrations dans le
tissu cellulaire du vagin. la base du con-
duit par après qd. d'incision que j'ai
trouvée à la méthode pratiquée par M. lecat.

5.^o Ch. Louis a taillé une femme par sa nuque
qui fait deux incisions latérales. L'opération a été
trouvée parfaite par tout les spectateurs et particul.
ement par M. le Col.

6.^o M. Audouville a pratiqué la nuque
de M. Thomas. Le larynx était disposé au
12 degré. L'incision du cou de la veine était
transversale, et tout aussi grande que dans
l'épave fait par M. Thomas qui avait mis
son larynx au 20.^o degré. Le reste de
l'opération semblable à ce qui avait été
fait par M. Thomas.

7.^o Ch. Louis a fait l'opération avec
le larynx caché, au 15.^o degré. La prostate
coupée, l'incision prolongée division un peu
en corps de la veine à côté de l'os
la coupe du ~~dehors~~ au dehors bien faite.

8.^o Ch. Fry a fait le grand appareil et
a introduit au lieu de gorge son contenu
dans un lequel il se propose de dévider
le col de la veine inférieurement. On ne
rien trouvé au col de la veine et il a
prétendu qu'il n'était point ^{la veine} dans la veine
au fond, mais qu'une fausse route
avait conduit entre la veine et le
rectum. Cette opinion a été regardée
comme non avenue.

9.^o M. Faber a pratiqué une seconde
fois la nuque avec un contenu en



il faudroit ouvrir le vésicule après le coup
de trépan, et voir ce que chaque instrument
fait dans le vésicule dans son introduction.
ne forber ma parole ne le pas savoir.

Croissant tranchant sur la convexité.
L'incision de la vésicule étoit verticale, bien
pleine, mais elle n'étoit pas plus grande
que dans l'impression avec le contour droit
qui fait angle avec le manche.

N^o. ch^r. Louis a taillé avec le lytho-
tome caché ouvert à 5 degrés. Le corps
étoit bon du extérieur à l'intérieur, on
la portait au col de la vésicule se font
trouver incises. cette taille a été trouvée
bonne et la même que celle de ch^r. Le
cat.

à l'encre incision extérieure près, qui
est étendue sans raison pour la protection
de ch^r. lecat.

Le mardi 4^e mars

Dans la salle des morts de l'hôtel Dieu
en présence de ch^r. Moreau, et de
ch^r. Louis, Andouille et vandergracht,
ch^r. lecat a taillé un figne à la
methode du fr. corne. Le lythotome
à 15 degrés. pour imiter l'action
des muscles de l'abdomen, ch^r. lecat
a fait comprimer fortement la région
hypogastrique avec le poignet. la prostate
entièrement comprimée. L'incision prolongée
au corps de la vésicule s'en trouve de
droit.

Causé d'hemorrhagie
causé par un accident primitif. et l'infirmité
tion d'une accidence consensuelle, qui produit
des albris des fignels invulnérables. La perfection
de la taille consiste à couper la prostate. on
peut le corps du dehors au dedans par d'a-
passe qui est un guide pour toutes les grandes
de l'intérieur. Les instruments. Dangers
d'ouvrir un figne dans le vésicule pour couper la
bouche de son col.

Le vendredi 7.^e mars à midi
dans l'école anatomique de l'hôpital de
la charité en présence des premiers commisaires
et de m.^r le d^r et fager l'aine, en morand
absent

m.^r de las a taillé quatre cadavres avec
le lyphotome caché

Le 1.^{er} au n.^o 15, ^{avec la lame pour le tour au aigu et tranchant} a retiré l'instrument en levant
la main. la prostate s'est trouvée entièrement
divisée. le ~~corps~~ de la vésie étoit coupé d'un grand
pouce par delà l'orifice, et la membrane neuvie
étoit incisée au dessus de la même longueur sur
le bas fond de la vésie. l'angle supérieur des
la division totale du corps de la vésie étoit ^{à un pouce} plus
haut ~~que l'orifice de l'urètre~~ ^{de l'orifice de l'urètre} et s'étendrait plus
loin en sorte que l'urine ^{qui sort} ~~sort~~ continuellement
goutte à goutte de l'urètre. s'est tombé dans
la plaie, ^{et s'étendait} qui découvroit de tissu cellulaire qui
unait la vésie au rectum.

Le 2.^e au n.^o 15 l'extrémité de la lame
enroulée. a retiré l'instrument en levant
la main. la vésie étoit coupée un pouce
au dessus du col jusqu'à l'orifice de l'urètre qui
s'ouvrait postérieurement dans l'angle supérieur des
l'urètre. il n'y avoit point de section dans le
tissu neuvie plus haut que la ~~section~~ division
complète qui de l'ide du col et du p^{er} du corps de la vésie qui y répond.

+ ceci marque l'utilité de la
correction. voir comme le p^{er} la annonce
dans ses écrits.



Le 3.^e avec de même lyphotome morse.
au n.^o 15
m.^r de las n'a pas baissé le p^{er} et
retirant l'instrument, qu'il en eut
été requis. quelques esprits soutenaient que le
p^{er} comme baissait le p^{er} et ceci a
fait recon~~naître~~ ^{revenir} à la description de

l'auteur dans laquelle il n'est pas marqué
dans quelles inclinaisons de main il faut
retirer l'instrument ce qui n'est point une
chose indifférente. Dans le corps qui
a été fait du bassin de ce 3.^e sujet
la vésie ouverte, M. le cat a montré
qu'on pouvoit couper un repli de la vésie
sur la pierre, ~~qui peut même raser~~
la lame du lithotome dans la vésie.

Le 4.^e au n.^o 15 l'instrument retiré
de piquer bien bas. Le col de la
vésie fut trouvé bien long. La prostate
dorsée en grande partie à cette taille
n'a point été trouvée de avantageuse.

Le même jour à quatre
heures après midi, dans école anatomique
de l'hôtel Royal des invalides, en
présence des mêmes commissaires et de
M. Desbarras, M. Moreau absent
1.^o M. le cat a taillé à sa méthode la
vésie étoit ouverte du côté du ventre
pour voir l'action de l'instrument sur le col
de la vésie. L'extraction de la pierre d'une
grosseur au dessus de la moyenne a produit
à la vésie un déchirement qui s'est prolongé
un peu au dessus de la prostate, ensuite que
le déchirement nous a paru fait aux mêmes
parties que le lithotome cache le corps
à son 15 degré.

reste à chercher si le déchirement consentif
est préférable à l'incision primitive toutes
choses égales. D'ailleurs nous de crainte de
l'hémorrhagie. danger de l'ouverture proprement dite, il faut
compter sur l'extensibilité de fibres, car de l'injection
trop vésie. conclure à peu.

2. M. Lorie a taillé avec le gch. eachi au n°
14. La vésie ouverte près la llemar pour juger
de l'effet de l'intromission pendant qu'il agit
sur le col de la vésie. La prostate se le colle
la vésie couverte avec plusieurs du corps à côté
de l'orifice. La membrane tirée avec ménagement
l'incision fut trouvée prolongée jusqu'à
la base. Dans la prostate précédente.

3. M. Lorie a taillé au grand
appareil, la coupe qu'il a faite étoit
en dedans du verumontanum; il avoit
vu le delide de col de la vésie.

4. M. Lorie fut servi de son gorgere
à lame tranchante. il a un peu incisé
le col de la vésie et coupe la prostate
extérieurement. La vésie étoit ouverte du
côté du ventre, et on a vu de moment
que le bulbe de la prostate ^{à juger par les} alloit porter de
l'orifice de la vésie.

ce instrument n'a pas été guéri

5. M. Thomas a fait son opération. La
vésie étoit très spacieuse et injectée. Son
intromission au n° 15 a fait une grande
incision qui a trouvé bien placé à côté
de la prostate au corps de la vésie.

6. M. Lorie fut servi de son gorgere
à lame tranchante sur le dernier sujet. La
vésie étoit ouverte ^{quand} l'homme par examina
le jeu des intromissions. Le col de la vésie un
peu delidé environ d'une ligne. La pierre qui
a tirée a fait un déchirement aussi grand que
dans les autres opérations et proportionné au volume
de ce corps étranger.



Le samedi 27. mars 1755
à l'hôpital de bièvre à quatre
heures après midi. en présence de
mesmes confrères, m^r. Le Dran, et
quelques absens.

vidu de l'incision de la main

1^o m^r. Moreau avec le lithotome ordinaire
a fait appuier le poire de la main droite
de celui qui tenoit pour soutenir la pierre
au dessus de l'urètre où il a commencé son
incision. a fait l'égale appareil tel qu'il
le pratique à l'hôpital d'en; et par le coup
de main n'a pas été jusqu'à briser
de la vessie.

2^o m^r. Moreau a fait d'atelle de
chepden avec un très petit bistouri
et telle que s'écarter la lèvre a montré
en angletisme. a pratiqué a deux copies
deux sa profonde et environ deux lignes de
section dans la vessie à côté de l'orifice
d'atelle bien faite.

3^o m^r. Le cas la méthode, de la vessie étoit
fort mauvaise; on ne faisoit que de la
faire illusion mais il n'a pas que le grand
appareil; c'est à dire qu'il n'a pas été jusqu'à
la prostate.

4^o m^r. Louis a fait d'atelle latérale
à la seconde manière de m^r. chepden
de droite par m^r. Sharp, en coupant la
prostate de derrière en devant et de
bas en haut. quoiqu'une déviation se soit
trouvée bien faite, elle a été suivie
plus difficile dans la pratique.

mais si elle a des avantages.

5. M^r. Thomas. la vésicule . n° 15. la
corpe de la vésie se trouve versale et à
côté ^{droit} de la vésie. cette opération a été estimée
la mieux faite de toutes celles qu'il a voit
pratiquées dans les différentes espèces de vésie.
les parties extérieures a fait voir qu'il avoit enlevé
une tranche de la prostate du côté gauche

O. M. Andrieux a fait exactement l'opposé
avec le l'phor caché. n.° 13 prouve la der-
nière par le type même se trouvant per-
due. Le col de la lampe est en copie d'un genre
par delà le col.

7. en fouber a opre' avec le lyschot-cade
n^o. 5. a terre d'astromene en ligne horizontale
d'alors, et a baine apuette. Le col a été
simplement debide' comme dans les apuettos
de ch^o. de cat.

8. M. try a fait le grand appareil -
la respiration étoit ouverte supérieurement a fin d'être
voir de près des instrumens dans le
cavité de cet organe. Le passage du doigt
dans la gouttière du gorgon pour préparer
l'entrée de la tenette, etant violente, le bout
du gorgon étoit porté vers la ^{partie intérieure de} ~~la~~ ~~fontaine~~
la respiration au dessus du bon fond et à vis la
pièce avec l'aide de la cravache dans
une respiration étroite? La tenette est entrée
sans peine, mais l'extraction de la pierre
a produit un déchirement terrible, une
amputation d'organe qui doit faire
proscrire absolument le grand appareil -
comme un machin très dangereux

rapport écrit de la main de m^r de Car
et signé de mess^{rs} Moreau, Brastide
et vandergraecht.

Le mardi 11 mars 1755. à l'hôtel
Dieu.

1^o je taillay à la methode de m^r Sharp.
la prostate se trouva coupée en entier, et
par là le col de la vessie débarrassé et libre
à recevoir toute la dilatation nécessaire à
l'extraction.

2^o je taillay un enfant de 4 ans avec
mon petit gougeron cystitique. L'incision
avait fait dans le corp de la prostate une
flogie avasée en dehors qui se terminoit
par un débilement d'une ligne environ
au col de la vessie.

3^o je taillay un adulte avec mon gougeron
cystitique simple. L'incision fut ^{debrise} ~~entière~~
~~une~~ d'une ligne ou d'une ligne et demie
au col de la vessie et coupait d'aplus grande
partie de la prostate antérieure.

Le mercredi 19^o mars

à 7 heures du matin aux invalides,
en présence de m^r de Car, de m^r de Car,
Moreau, Ledran, Houtet, Guerin, Fager, Androuët,
de Car, Brastide, vandergraecht et Louis

1^o m^r de Car a fait sa methode pendre qu'on
aide comprime le bas ventre fortement et
pousse les intestins vers la vessie, pour vaincre
l'effet de l'action du diaphragme. La prostate
coupée antérieurement dans la moitié de son
épaisseur, et le col de la vessie incisé d'une
ligne.

a fort mal opéré. il ne voit plus
clair et la vision n'est pas légère

ce fait notable par les femmes
appliquées aux hommes.

2^e. m. Ledran a taillé au grand appareil
^{à l'usage} de l'infirmité de col de la vessie avec un scalpel
qui imitait sa méthode. il n'a pas atteint la
prostate, ce qu'il aurait pu faire en pratiquant son incision
secondairement plus profondément. Il nous a
parlé d'une double fistule latérale avec une
instrument nouveau dont il n'a donné l'indication
dans aucun de ses ouvrages.

3^e. m. qu'on de grand appareil, n'a pas été
plus près du col de la vessie que 13 lignes en
dessous du verumontanum.

4^e. m. vandergraef a pratiqué la méthode de
m. le car; et a fait la coupe des mêmes parties
que celles de m. le car, mais avec des incisions.

5^e. m. Ledran fait son de l'hyposphène caché
au n^o 9. n'a pas abandonné les parties avec le dos
de l'instrument. quoique la vessie n'ait pas été
coupée, la vessie était blesée postérieurement.
l'incision du col était bien faite.

Le même jour à 13 heures après midi
à la Salpêtrière

en présence des m^{rs} Thomas, vandergraef
Recar, du four, Louis

1^o. m. le car sa méthode sur un enfant
avec l'hyposphène. les mêmes parties intéressées
comme dans l'adulte.

2^o. m. le car ^{à l'usage} sa méthode avec la gorge
l'hyposphène. le même résultat.

3. m. de four, un enfant de 4 à 5 ans avec
l'hyposphène caché. n^o 7 tiré horizontalement. le
corps de la vessie totalement coupé par-delà la
prostate divisée; l'ouverture de la vessie par-delà
la prostate ressembloit à l'entrée d'un intestin
épanché d'une vessie dans l'utérus cellulaire.



legd. appareil univoque veritable. Soient on se
fait que legd. appareil; son mauvais. on fait
quelques fois l'appareil lateral, alors on. Soient on se
trop, sans l'acider. considerable.

Les varietes des resultats de
cette operation faite par les gens
et par la direction de l'auteur
provenant qu'elle est par force.

4. m. dois un enfant de 3 a 4 an, n° 5
sans abandonner les pubis a un baipare le
poignet. une manchette a dorso de la vesie.
la femme de l'incision etoit un peu endee du
verumontanum, le golfes de prostates deprimé
n'avoit point été touché. c'est le legd. appareil

le meme jour a Boiret

a 4 heures apres midy

en presence de m^r de pr. chir. forbes
Houtet, lecat, Bastula, vandergracht, try,
desfours, lafaye andouille et Louis.

1^o m. Vandergracht, de taille de m^r.
Thomas n° 10 a fait a la vesie une coupe
verticale, un peu trop haute et trop a coté de
l'orifice.

2^o m. lecat, taille de m^r. Thomas n° 10.
l'incision de la vesie bien faite, l'angle inf^r.
plus proche de l'uretere.

3. m. Louis, taille de m^r. Thomas n° 10 estuie
la mieux faite de toutes celles qui avoient été
pratiquées dans les operations precedentes. Le n° 10
juste suffisant pour tirer la plus grosse pierre.
en tournant un peu l'instrument vers la branche
de l'echion, ce degre d'inclinaison eloigne l'angle
inf^r de l'incision de l'uretere.

4^o m^r. Forbes n'est pas entré dans la vesie
avec l'instrument de m^r. Thomas.

5^o m. Andouille dans le cours de l'operation
instrument; on a trouve l'orifice de la vesie
au beau milieu de l'incision du corps de la
vesie.

mauvais pratique

6^e en try a fait le 2^e appareil, et au lieu de
gorger a introduit un grand contour droit pour
couper la portate cubical de la vesie. on a
trouvé beaucoup de sang dans les tiges cellulaires.
La portate étoit dirigée en dedans au droit à une
ligne de distance. il n'a point de guérison.

7^e en Thomas a fait son opération sur un
pigeon rachitique qui n'étoit pas guéri, et
dans la vesie n'étoit point dilaté par l'injection.
et cette opération s'est trouvée avoir été bien
faite.

8^e m^r Bostide a fait la taille de cet
decat d'injection ordinaire.

9^e m^r Fowler a fait celle de cet.

Thomas n^o 10. a pénétré dans la vesie,
et en retirant l'instrument a bien tiré
une larme inférieure de la place pour l'agrandir.
Après de la vesie a monté l'injection au-dessus
de l'orifice de la vesie dans la ligne moyenne
du corps parallèlement à la symphyse de pubis.

m^r de Car Bostide a recommandé
pour guérir le frottement de la



no 15